

Elevage :

LISTE DES VACHES éligibles au TRI

Gestion des strongles gastro-intestinaux

> CONTEXTE

La gestion du parasitisme est importante pour améliorer les performances zootechniques des animaux et assurer la maîtrise sanitaire du troupeau.

Cependant, le contexte économique et environnemental mais aussi le développement de résistances des parasites aux médicaments incitent à une meilleure utilisation de ces produits.

La mise en place du TRI (Technique Raisonnée Individualisée) permet de répondre à ces enjeux et notamment :

- **D'améliorer la rentabilité de la vermifugation** : en ciblant les animaux avec une probabilité de réponse en lait meilleure
- **De limiter les rejets environnementaux et limiter le risque de résistance** : en optimisant la quantité de matières actives utilisées

> MÉTHODE UTILISÉE


- En fin de pâturage, les **vaches sélectionnées** sont celles à moins de 200 jours de lactation et qui ont réalisé un pic de production laitière décevant par rapport aux animaux de la même classe d'âge

La réponse en lait des animaux sélectionnés sera d'autant plus forte que le troupeau pâture (>20 ares/VL) et présente un Temps de Contact Effectif faible (< 8 mois).

- **L'Indicateur d'Exposition aux Endectocides (I2E)** évalue la quantité de matières actives utilisée ramenée au poids vif du troupeau. C'est un indicateur important pour mesurer de façon indirecte l'impact environnemental des traitements antiparasitaires (faune non cible, milieu aquatique, flore,...). Il est calculé ici juste sur le volet VL à la rentrée à l'étable.

> CONCRÈTEMENT DANS VOTRE ÉLEVAGE :


- Mécanique de sélection des animaux éligibles au T.R.I



• Impacts économique et écologique du T.R.I

	AUCUNE VERMIFUGATION	VERMIFUGATION 100 % DES VL	VERMIFUGATION SELECTIVE Avec TRI SECURISÉ	VERMIFUGATION SELECTIVE Avec TRI OPTIMISÉ
Marge supplémentaire "troupeau" permise par la vermifugation des vaches (<i>produit lait gagné - coûts de traitement</i>)	Perte pouvant aller jusqu'à 2 kg/VL/j	Référence Base 100	+54%	+48%
Indicateur d'Exposition Endectocides IZE exprimé en mg de matière active / 100 kg de poids vif	0	50	4	3

• Dispersion des pics de lait par rang de vêlage (pour les vaches à moins de 200 jours)



En vert : seuil du TRI OPTIMISÉ / en marron : seuil du TRI SECURISÉ



Plus d'informations sur :
www.jefaisletri.com

• Liste nominative des vaches prioritaires du T.R.I.

NUMERO	NOM	RACE	PARITE	PIC	TRI	REMARQUES
2189	rafaella	46	1	20.2	OPTIMISE	
2164	piranha	46	1	25.9	OPTIMISE	
2191	romance	46	1	27.0	OPTIMISE	
3935	palourde	46	2	21.1	OPTIMISE	
3913	panama	46	2	28.7	OPTIMISE	
3896	olivette	46	2	29.0	OPTIMISE	
8209	naples	46	3+	26.6	OPTIMISE	
7537	oursonne	46	3+	28.2	OPTIMISE	
7512	nadia	46	3+	32.1	OPTIMISE	
7511	nounette	46	3+	32.2	OPTIMISE	
2192	rosace	46	1	27.2	SECURISE	
3900	oliday	39	2	30.2	SECURISE	
2484	lisa	46	3+	32.3	SECURISE	

Mise à disposition des données avec accord éleveurs,



Plus d'informations sur :
www.jefaisletri.com

Ensemble, au-delà de la santé animale



Mise à disposition des données avec accord éleveurs,



Plus d'informations sur :
www.jefaisletri.com

Ceva Santé Animale
www.ceva-santeanimale.fr



Ensemble, au-delà de la santé animale

